

I-MASK+

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РАННО АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19

Стр. 1/2

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОФИЛАКТИКА

Ивермектин	<i>Профилактика при лица с висок риск</i> 0.2 мг/кг на доза* – една доза на първия ден, втора доза след 48 часа, след което се приема една доза на всеки 2 седмици** <i>Профилактика след контакт с COVID-19***</i> 0.2 мг/кг на доза* – една доза на първия ден, втора доза след 48 часа
Витамин D3	1000-3000 МЕ/ден
Витамин С	1000 мг два пъти дневно
Кверцетин	250 мг/ден
Цинк	50 мг/ден
Мелатонин	6 мг преди лягане (причинява сънливост)

ПРОТОКОЛ ЗА РАННО АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ****

Ивермектин	0.2 мг/кг на доза* — една доза дневно за минимум 2 дни, като дневният прием продължава до оздравяване (максимум 5 дни)**
Витамин D3	4000 МЕ/ден
Витамин С	2000 мг 2-3 пъти дневно
Кверцетин	250 мг два пъти дневно
Цинк	100 мг/ден
Мелатонин	10 мг преди лягане (причинява сънливост)
Аспирин	325 мг/ден (освен ако не е противопоказано)

* ≈ 0.09 мг/паунд на доза (да се приема на гладно с вода). Пример за човек, тежащ 60 кг (телесно тегло): $60 \text{ кг} \times 0,2 \text{ мг} = 12 \text{ мг}$ – моля вижте таблицата за превръщане (кг→паунд) на страница 2, за да изчислите подходящата доза ивермектин.

** Дозировката може да бъде актуализирана при резултати от по-нататъшни научни изследвания.

*** Да се използва, ако член на домакинството е положителен за COVID-19 или при продължителен контакт без маска с пациент, положителен за COVID-19

**** За късна фаза – хоспитализирани пациенти – вижте протокола MATH + на FLCCC за болнично лечение на COVID-19 на www.flccc.net

Моля, обърнете внимание на нашето **заявление-отказ от отговорност** и на допълнителната информация на страница 2 на този документ.

Поведенческа профилактика



НОСЕТЕ МАСКИ

Трябва да се носи текстилна, хирургическа или маска N95 (без клапан) във всички пространства на закрито, на които присъстват лица, които не са от едно домакинство. Трябва да се носи маска N95 (без клапан) по време на продължителен контакт с лица, които не са от едно домакинство, във всички затворени, недобре проветрявани пространства.



СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ

До края на кризата с Covid-19 препоръчваме да се спазва минимална дистанция от около 2 м/6 фута в публични пространства от хора, които не са от вашето домакинство.



МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ

Препоръчваме, по време на и след излизания извън дома (пазаруване, метро и др.), старателно почистване на ръцете (20–30 секунди със сапун) или междуременно използване на дезинфектант за ръце.

I-MASK+

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РАННО АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19

Стр. 2/2

ИВЕРМЕКТИН

Резюме на резултатите от клиничните изследвания за ивермектин при COVID-19

Ивермектинът – антипаразитно лекарство, чието откриване спечели Нобелова награда през 2015 г., има доказани при лабораторни изследвания силно действащи, антивирусни и противовъзпалителни свойства.

През последните 4 месеца при многобройни, контролирани клинични изследвания от страна на множество центрове и страни по света се съобщава за стабилно, значително подобрене в резултатите на пациентите с COVID-19 при лечение с ивермектин.

Нашият изчерпателен научен обзор на тези изследвания за ивермектин, на които се позоваваме, може да бъде намерен на www.flccc.net/flccc-ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-covid-19/.

За кратък преглед, **Кратко резюме** на нашия обзор за ивермектин може да бъде намерено на www.flccc.net/one-page-summary-of-the-clinical-trials-evidence-for-ivermectin-in-covid-19/

Превръщане на телесно тегло (кг/паунд) за дозата ивермектин при профилактика и лечение на COVID-19

Телесно тегло		Доза	
Превръщане (1 кг ≈ 2.2 паунда) (доза, изчислени за горната граница на диапазона на теглото)		0.2 мг/кг ≈ 0.09 мг/паунд (всяка таблетка = 3 мг; дози, закръглени до половин такава таблетка)	
70-90 паунда	32-40 кг	8 мг	(3 таблетки = 9 мг)
91-110 паунда	41-50 кг	10 мг	(3.5 таблетки)
111-130 паунда	51-59 кг	12 мг	(4 таблетки)
131-150 паунда	60-68 кг	13.5 мг	(4.5 таблетки)
151-170 паунда	69-77 кг	15 мг	(5 таблетки)
171-190 паунда	78-86 кг	16 мг	(5.5 таблетки)
191-210 паунда	87-95 кг	18 мг	(6 таблетки)
211-230 паунда	96-104 кг	20 мг	(7 таблетки = 21 мг)
231-250 паунда	105-113 кг	22 мг	(7.5 таблетки = 22.5 мг)
251-270 паунда	114-122 кг	24 мг	(8 таблетки)
271-290 паунда	123-131 кг	26 мг	(9 таблетки = 27 мг)
291-310 паунда	132-140 кг	28 мг	(9.5 таблетки = 28.5 мг)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Протоколът I-Mask+ за профилактика и ранно амбулаторно лечение на COVID-19 и протоколът MATH+ за болнично лечение на COVID-19 са единствено за образователни цели по отношение на потенциално полезните терапии при COVID-19. Никога не пренебрегвайте професионалните медицински съвети заради нещо, което сте прочели в нашия уебсайт и публикации. Те не са предназначени да заместят професионалните медицински съвети, диагностика или лечение по отношение на който и да е пациент. Лечението на отделен пациент трябва да разчита на преценката на вашия лекар или друг квалифициран здравен специалист/учреждение. Винаги търсете техния съвет по всякакви въпроси, които може да имате, относно вашето здраве или медицинска диагноза.

Резюме на публикуваните данни, подкрепящи обосновката за употребата на ивермектин в нашия протокол I-MASK+, може да бъде изтеглено от www.flccc.net/i-mask-prophylaxis-treatment-protocol/

За актуализации, позовавания и информация за **Алианс FLCCC, Протокол I-Mask+ за профилактика и ранно амбулаторно лечение на COVID-19** и **Протокол MATH+ за болнично лечение на COVID-19**, моля посетете нашия уебсайт.